



PLAGAS	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES	
ARAÑA ROJA, ARAÑA BLANCA, MINADOR	ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V	3	2	REPETIR SI ES NECESARIO A LOS 7 DIAS	ESPERAR 2 SEMANAS PARA REALIZAR SUELTAS, DESPUÉS POR FOCOS
MOSCA BLANCA PULGONES	ACETAMIPRID 20% [SP]	3	2	PS: 3 DÍAS EN INVERNADERO	REPETIR SI ES NECESARIO A LOS 14 DIAS
TRIPS, ARAÑA ROJA	ACRINATRIN 7,5% [EW]	NP	2	INTERVALO DE 10 DÍAS ENTRE ELLAS, ANTES DEL INICIO DE LA FLORACIÓN.	CONTRA FORMAS MÓVILES. ÚNICAMENTE EN INVERNADERO.
MOSCA BLANCA, TRIPS, MINADOR,	AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V	3	3	APLICAR A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA O A ULTIMA DE LA TARDE. SI ES NECESARIO REPETIR A LOS 7 DIAS	
MOSCA BLANCA, TRIPS, ORUGAS, MINADOR, PULGON, ACAROS	AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/V	3	3	APLICAR A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA O A ULTIMA DE LA TARDE. SI ES NECESARIO REPETIR A LOS 7 DIAS	
ORUGAS	AZUFRE 60% + BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 1,43% (1X10E6 UI/G) [DP] P/P	5		NO TIRAR SI SE HA ECHADO ACEITES ANTES /DESPUES DE 30 DIAS. REPETIR SI ES NECESARIO A LOS 14 DIAS	
ARAÑA ROJA, ACAROS, OIDIO	AZUFRE 80% [WG] P/P	NP		NO TIRAR SI SE HA ECHADO ACEITES ANTES /DESPUES DE 30 DIAS	
ORUGAS	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 15% (15 MILL. DE U.L/G) [WG] P/P	NP		NO DEJAR EL CALDO PREPARADO MÁS DE 12 HORAS	ESTADIOS LARVARIOS L1 Y L2
ORUGAS	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.L/G) [WG] P/P	NP		NO DEJAR EL CALDO PREPARADO MÁS DE 12 HORAS	ESTADIOS LARVARIOS L1 Y L2
ORUGAS	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.L/G) [WG] P/P	NP		NO DEJAR EL CALDO PREPARADO MÁS DE 12 HORAS	ESTADIOS LARVARIOS L1 Y L3
MOSCA BLANCA	BEAUVERIA BASSIANA 10,6% (2,11X10E10 CONIDIAS/ML) [SC] P/V	NP		NO MEZCLAR CON FUNGICIDAS	NO APLICAR CON HR <50%
MOSCA BLANCA, TRIPS	BEAUVERIA BASSIANA 2,3% (2,3 X 10E9 CONIDIAS VIABLES/ML) [OD] P/V	NP		NO MEZCLAR CON FUNGICIDAS	NO APLICAR CON HR <50%
MOSCA BLANCA	BEAUVERIA BASSIANA 22% (4,4 X 10E10 CONIDIAS/G) [WP] P/P	NP		NO MEZCLAR CON FUNGICIDAS	NO APLICAR CON HR <50%
	CIPERMETRIN 10% [EC]	3	1		
MOSCA BLANCA, MOSQUITO VERDE, ORUGAS, PULGONES, TRIPS	CIPERMETRIN 50% [EC] P/V	3	2	INTERVALO DE 10 DÍAS	
ORUGAS	CLORANTRANILIPROL 35% [WG] P/P	1	2	ESPERAR COMO MINIMO 7 DIAS PARA REPETIR	
ORTOPTEROS, OTIORRINCO, LARVAS DE NOCTUIDOS	CLORPIRIFOS 1% [RB]	5	1		
CHINCHE VERDE, HELIOTIS, ORUGAS, PULGONES, TRIPS	DELTAMETRIN 2,5% [EC]	3	3		
ORUGAS	EMAMECTINA 0,855% (BENZOATO) [SG] P/P	3	3	INTERVALO DE 7 DÍAS	SOLO 1 VEZ, HASTA 3-4 DIAS ANTES DE SUELTAS.
NEMATODOS, DORADILLA	ETOPROFOS 10% [GR] P/P	60		INCORPORAR AL SUELO MEDIANTE LABOR DE GRADA.	3 SEMANAS ANTES DE SUELTAS. MÁS DE 4 PARA ANTOCORIDOS
NEMATODOS	FENAMIFOS 24% [CS] P/V	60	2	EN PRETRANSPLANTE	3 SEMANAS ANTES DE SUELTAS. NO UTILIZAR SI HAY COLMENAS.

LAS LETRAS EN ROJO INDICA QUE SÓLO ESTÁN PERMITIDOS ALGUNOS NOMBRES COMERCIALES DE DICHAS MATERIAS ACTIVAS. ESTA LISTA ES SUSCEPTIBLE DE SER MODIFICADA, EN CASO DE DUDA CONSULTE CON SU TÉCNICO.



PLAGAS	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES	
MOSCA BLANCA, PULGON	IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V	3	1		
ORUGAS, CHINCHES, MOSQUITO VERDE	INDOXACARB 30% [WG] P/P	1	6	ESPERAR COMO MINIMO 10-14 DIAS PARA REPETIR	
CHINCHE VERDE, MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGON	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V	3	2	NUMERO DE MAXIMO DE APLICACIONES SEGÚN CONCENTRACION Y FORMULACIÓN.	SOLO POR FOCOS
CHINCHE VERDE, MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGON	LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V	3	1	NUMERO DE MAXIMO DE APLICACIONES SEGÚN CONCENTRACION Y FORMULACIÓN.	SOLO POR FOCOS
CHINCHE VERDE, MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGON	LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P	3	1	NUMERO DE MAXIMO DE APLICACIONES SEGÚN CONCENTRACION Y FORMULACIÓN.	SOLO POR FOCOS
LEPIDOPTEROS TRIPS	LUFENURON 5% [EC] P/V	7	3	ESPERAR DE 7-10 DIAS PARA VOLVER A REPETIR	2 SEMANAS ANTES DE SUELTAS DE ANTOCORIDOS, MIRIDOS Y COCCINELIDOS
CHINCHES, HELIOTIS, SPODOPTERA	METAFLUMIZONA 24% [SC] P/V	3	1	SOLO EN INVERNADEROS.	
BABOSAS, CARACOLES	METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB]	15			
HONGOS DEL SUELO, INSECTOS DEL SUELO, NEMATODOS, MALAS HIERBAS	METAM SODIO 50% (ANHIDRO) [SL]	NP	1		
ORUGAS, ROSQUILLA NEGRA, TRIPS	METIL CLORPIRIFOS 22,4% [EC]	5			
TRIPS	METIOCARB 20% [SC]	NP	2		
MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGONES	METOMILO 25% [WP]	14	2	REPETIR SI ES NECESARIO A LOS 14 DIAS	
PLUSIA, SPODOPTERA	METOXIFENOCIDA 24% [SC] P/V	1	3		
ACAROS, INSECTOS DEL SUELO, LIRYOMIZA, NEMATODOS, PULGONES, TRIPS, MOSCA BLANCA	OXAMILO 10% [SL] P/V	21	3	1er TRATAMIENTO. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL TRANSPLANTE. LUEGO CADA 10-14 DIAS.	
MOSCA BLANCA, PULGON	PIMETROZINA 25% [WP] P/P	3	3	SI FUERE NECESARIO REPETIR A LOS 14 DIAS	2 SEMANAS ANTES DE SUELTAS. DESPUES SOLO EN
PULGON	PIMETROZINA 50% (ESP) [WG] P/P	3	2	SI FUERE NECESARIO REPETIR A LOS 14 DIAS	2 SEMANAS ANTES DE SUELTAS. DESPUES SOLO EN FOCOS
MOSCA BLANCA,		3	1		
HORMIGAS, INSECTOS, PULGONES	PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V	3			HASTA 2-3 DIAS ANTES DE LAS SUELTAS, LUEGO SOLO POR FOCOS
PULGON	PIRIMICARB 50% (ESP) [WG] P/P	3	1		ANTES SUELTAS DE AUXILIARES, DESPUÉS POR
MOSCA BLANCA	PIRIPROXIFEN 10% [EC]	3	1		NUNCA DURANTE LA INSTALACION DE <i>A. swirskii</i>
TRIPS, ORUGAS	SPINOSAD 48% [SC] P/V	3	3		1-2 SEMANAS ANTES DE SUELTA DE AUXILIARES, DESPUES POR FOCOS.
ARAÑA ROJA, MOSCA BLANCA, ARAÑA BLANCA	SPIROMESIFEN 24% [SC] P/V	3	4	SI FUERE NECESARIO REPETIR A LOS 7 DIAS	TOXICIDAD REDUCIDA-MEDIA SOBRE FITOSEIDOS. APLICAR CUANDO LAS POBLACIONES SEAN ALTAS
COCHINILLA HARINOSA, PULGON, MOSCA BLANCA	SPIROTETRAMAT 15% [OD] P/V	3	4		
ORUGAS	TEBUFENOCIDA 24% [SC] P/V	3	3	SI FUERE NECESARIO REPETIR CADA 7-14 DIAS	CUIDADO EN LA FASE DE INSTALACION DE
MOSCA BLANCA, PULGONES	TIACLOPRID 18% [OD] P/V	3	1	SI FUERE NECESARIO REPETIR CADA 7-14 DIAS	3-4 SEMANAS ANTES DE SUELTAS
MOSCA BLANCA	TIAMETOXAM 25% [WG] P/P	3	2	SI FUERE NECESARIO REPETIR CADA 7-14 DIAS	
PULGONES					

LAS LETRAS EN ROJO INDICA QUE SÓLO ESTÁN PERMITIDOS ALGUNOS NOMBRES COMERCIALES DE DICHAS MATERIAS ACTIVAS. ESTA LISTA ES SUSCEPTIBLE DE SER MODIFICADA, EN CASO DE DUDA CONSULTE CON SU TÉCNICO.



ENFERMEDADES	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES
OIDIO	AMPELOMICES QUISQUALIS 58% [WG]	NP	4	
ALTERNARIA, CLADOSPORIOSIS, MILDIO, OIDIO	AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC] P/V (ESP.)	3	2	INTERVALO ENTRE APLICACIONES DE 7-10 DÍAS.
OIDIO	AZOXISTROBIN 12% + TEBUCONAZOL 20% [SC]	3	2	INTERVALO ENTRE APLICACIONES DE 10-14 DÍAS.
MILDIO, OIDIO	AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V (ESP.)	3	2	intervalos de 10-12 días sin superar 1 l/Ha. de producto por aplicación.
OIDIO	AZUFRE 80% + CIPROCONAZOL 0,8% [WG]	5		NO REALIZAR DOS TRATAMIENTOS SEGUIDOS
BOTRITIS	BACILLUS SUBTILIS 15,67% [WP]	3		
OIDIO	BUPIRIMATO 25% [EC]	3		
ALTERNARIA, ANTRACNOSIS, BOTRITIS, MILDIO	CAPTAN 47,5% [SC]	21	3	Intervalos de 7 días.
	CAPTAN 80% [WG]			
OIDIO	CIPROCONAZOL 10% [WG]	3		
ALTERNARIA, ANTRACNOSIS, BOTRITIS, MILDIO, SEPTORIA	CLORTALONIL 50% [SC]	3	2	
OIDIO, ALTERNARIA,	DIFENOCONAZOL 12,5% + CIFLUFENAMIDA 1,5% [DC]	3	2	
OIDIO, ALTERNARIA	DIFENOCONAZOL 25% [EC]	7	4	INTERVALO ENTRE APLICACIONES DE 7-10 DÍAS.
FUSARIUM	DITIANONA 75% [SC]	14		APLICAR AL 2º O 3er RIEGO, ANTES DE LA APARICION DE LOS SÍNTOMAS
FITOPHTORA, PITIUM, FUSARIUM, RIZOCTONIA	ETRIDIAZOL 48% [EC]	3		APLICAR SOLO EN INVERNADERO
BOTRITIS	FENHEXAMIDA 50% [WG]	1	3	INTERVALO ENTRE APLICACIONES DE 7-10 DÍAS.
OIDIO	FLUTRIAFOL 12,5% [SC]	3	2	REPETIR CADA 10 DIAS SI FUERE NECESARIO
ENF. DE RAIZ Y CUELLO	FOSETIL 31% + PROPAMOCARB 53% [SL]	3	2	LEER INSTRUCCIONES DE USO.
OIDIO	KRESOXIM-METIL 50% [WG]	4	4	SI FUERE NECESARIO REPETIR CADA 7 DÍAS, CADA DOS
PODREDUMBRE, VERTICILIUM	METIL TIOFANATO 70% [WG]	NP	1	
OIDIO	MICLOBUTANIL 12,5% [EC]	3		
	MICLOBUTANIL 24% [EC]			
RIZOCTONIA	PENCICURON 25% [SC]	NP		EN EL TRANSPLANTE
OIDIO	PENCONAZOL 20% [EW]	3	2	INTERVALO ENTRE APLICACIONES DE 7-10 DÍAS.
BOTRITIS,	PIRACLOSTROBIN 6,7% (ESP) + BOSCALIDA 26,7% () [WG]	3	1	
OIDIO				
ENF. DE RAIZ Y CUELLO	PROPAMOCARB 60,5% [SL]	3	4	INTERVALO ENTRE APLICACIONES DE 7-15 DÍAS.
OIDIO, CLADOSPORIOSIS	TEBUCONAZOL 25% [WG]	3	3	SI FUERE NECESARIO ESPERAR 12-14 DIAS
HERBICIDAS	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES
DICOTILEDONEAS	DIQUAT 20% (DIBROMURO IT) [SL]	NP		APLICAR EN PREEMERGENCIA O PRETRASPLANTE DEL CULTIVO.
DICOTILEDONEAS	DIQUAT 20% (DIBROMURO) [SL]	15	3	APLICAR EN PREEMERGENCIA O PRETRASPLANTE DEL CULTIVO.
GRAMINEAS ANUALES	FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V	21	1	APLICAR EN POSTEMERGENCIA DEL CULTIVO
GRAMINEAS ANUALES	QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC]	21		

LAS LETRAS EN ROJO INDICA QUE SÓLO ESTÁN PERMITIDOS ALGUNOS NOMBRES COMERCIALES DE DICHAS MATERIAS ACTIVAS. ESTA LISTA ES SUSCEPTIBLE DE SER MODIFICADA, EN CASO DE DUDA CONSULTE CON SU TÉCNICO.