



PLAGAS	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES
ACAROS, GUS. GRISES, MINADORES, ORUGAS, PULGONES, TRIPS	AZADIRACTIN 3,2% [EC]	3		Aplicar a 1ª hora de la mañana o a última hora de la tarde. Intervalo de 7 días
MOSCA BLANCA, PULGONES	ACETAMIPRID 20% [SG]	7	2	Intervalo de 14 días
MOSCA BLANCA, PULGONES	ACETAMIPRID 20% [SP]	7	2	Intervalo de 14 días
ORUGAS	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI	NP		
ORUGAS, HELIOTIS, PLUSIA	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	NP		
ORUGAS, PULGONES	CIPERMETRIN 10% [EC]	3	2	Intervalo de 10 días
	CIPERMETRIN 20% [WP]			
	CIPERMETRIN 50% [EC]			
ORTOPTEROS	CLORPIRIFOS 1% [RB]	NP	1	Aplicar antes del estado de cultivo de "Quinta hoja desplegada".
LARVAS INSECTOS, DORADILLA, GUS. BLANCOS, GUS. GRISES	CLORPIRIFOS 5% [GR]	NP	1	Granulado, aplicar al suelo.
ORUGAS, PULGONES	DELTAMETRIN 1,5% [EW]	3	3	Intervalo de 7-14 días
	DELTAMETRIN 1,57% [SC]			
	DELTAMETRIN 2,5% ((ESP I)) [EC]			
	DELTAMETRIN 10% [EC]			
TALADRO	BETACIFLUTRIN 2,5% [SC]	7	2	Intervalo de 14 días
ORUGAS	INDOXACARB 30% [WG]	10	3	Intervalo de 10-14 días
ORUGAS, PULGONES	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS]	3	2	Intervalo de 10-14 días
	LAMBDA CIHALOTRIN 5%			
	LAMBDA CIHALOTRIN 10%			
CARACOL, BABOSAS	METALDEHIDO 5% [GB]	15		
HORMIGAS, INS. SUELO, PULGONES	PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC]	3		No aplicar en plantas mojadas
PULGON	PIRIMICARB 50% (ESP) [WG]	7	1	
ORUGAS	SPINOSAD 48% [SC]	7	3	Intervalo de 7 días
MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGONES, TRIPS, ÁCAROS TETRANÍQUIDOS	TAU-FLUVALINATO 10% [EW]	14		
	TAU-FLUVALINATO 24% [SC]			
ENFERMEDADES	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES
OIDIO	AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [EC]	7	3	Intervalo de 10 días
MILDIU, OIDIOPSIS	AZOXISTROBIN 25% [SC]	7		Intervalo de 10-12 días
ALTERNARIA, ANTRACNOSIS, BACTERIOSIS, MILDIU	COMPUESTOS CÚPRICOS			
OIDIO	DIFENOCONAZOL 25% [EC]	14	3	Intervalo de 12 días
MILDIU	DIMETOMORF 7,2% + PIRACLOSTROBIN 4% [EC]	3	3	
PODREDUMBRE, VERTICILIUM	METIL TIOFANATO 70% ((ESP I)) [WG]	NP	1	Tratamiento del suelo, en riego por goteo.
OIDIO	MICLOBUTANIL 12,5% [EC]	3		
	MICLOBUTANIL 24% [EC]			
	MICLOBUTANIL 4,5% [EW]			
RIZOCTONIA	PENCICURON 25% [SC]	NP		Tratamiento de los esquejes por inmersión.
OIDIO	PENCONAZOL 10% [EC]	14	2	Intervalo de 10 días
	PENCONAZOL 20% [EW]			
OIDIO	QUINOXIFEN 25% [SC]	3	3	Intervalo de 8-10 días
OIDIOPSIS	TETRACONAZOL 4%	7	3	Intervalo de 7-10 días
	TETRACONAZOL 10% [EC]			
	TETRACONAZOL 12,5% [ME]			
OIDIOPSIS	TRIADIMENOL 25% [EC]	7		
HERBICIDAS	MATERIA ACTIVA	PS	Nº MAX APLICACIONES	OBSERVACIONES
GRAMINEAS	CLETODIM 12% [EC]	40	1	
	CLETODIM 24% [EC]			
MALAS HIERBAS (DICOTILEDONEAS)	DIQUAT 20% (DIBROMURO (ESP)IT) [SL]	NP		Aplicar en preemergencia o pretrasplante del cultivo.
	DIQUAT 20% (DIBROMURO) [SL]	15		
GRAMINEAS	FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC]	21	1	
MALAS HIERBAS	PENDIMETALINA 33% (ESPII) [EC]	90	1	Antes de la plantación
	PENDIMETALINA 45,5% [CS]	NP		